



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

017-5 12-83418258

Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31130 BALMA  
Tél. (61) 24 06 51

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
Abonnement annuel : 80 F  
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne  
CCP : 8612-11 R Toulouse

BULLETIN N° 17 DU 28 NOVEMBRE 1983

## CEREALES

### \* STADES PHENOLOGIQUES

- Orge : 1 à 2 feuilles à début tallage.
- Blé : Levée à 3 feuilles.

### \* JAUNISSE NANISANTE

➡ Un traitement insecticide destiné à détruire les pucerons est conseillé sur toute céréale non encore traitée, à partir du stade 2 feuilles, dès que la présence de pucerons est notée sur au moins 10 % de plantes dans une parcelle.

A titre indicatif, cette situation se rencontre fréquemment (plus de 30 % des parcelles dans la Haute-Garonne et le Tarn) et les analyses de laboratoire indiquent que dans certaines situations, 50 % des pucerons sont porteurs du virus de la jaunisse nanisante.

➡ Dans les parcelles précoces traitées depuis plus de 3 semaines, surveiller les recolonisations éventuelles par les pucerons. Une seconde intervention insecticide est nécessaire si on observe à nouveau plus de 10 % des plantes infestées.

\*  
\*                      \*  
\*

739